

| Alter            | NEUE Empfehlung der STIKO   | Bisheriger Plan unserer Praxis                             |
|------------------|---|--|
| 2 Monate         | Rotavirus Schluckimpfung<br>6-fach Impfung<br>Pneumokokken<br><b>1. Meningokokken B</b> | Rotavirus Schluckimpfung<br>6-fach Impfung<br>Pneumokokken |
| 3 Monate mit U4  | 2. Rotavirus  | 2. Rotavirus<br><i>1. Meningokokken B</i>                  |
| 4 Monate         | 2. 6-fach Impfung<br>2. Pneumokokken<br><b>2. Meningokokken B</b>                       | 2. 6-fach Impfung<br>2. Pneumokokken                       |
| 6 Monate mit U5  |   | <i>2. Meningokokken B</i>                                  |
| 11 Monate mit U6 | 1. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken  | 1. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken                       |
| 12 Monate        | 3. 6-fach Impfung<br>3. Pneumokokken  | 3. 6-fach Impfung<br>3. Pneumokokken                       |
| ab 12 Monate     | <b>3. Meningokokken B</b><br>Meningokokken C  | <i>3. Meningokokken B</i>                                  |
| 14 Monate        | 2. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken  | 2. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken<br>Meningokokken C    |

**Frühgeborene (unter 37 SSW) erhalten bei der U4 eine zusätzliche 6-fach Impfung und eine gegen Pneumokokken.**

|               |   |
|---------------|---|
| Einschulung   | Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten                                       |
| ab 9 Jahren   | Kinderlähmung<br>HPV („Intimkrebs“ bei Frauen und Männern, Genitalwarzen) |
| ab 12 Jahren  | Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten                                       |
| Elternimpfung | Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung; Masern, Mumps, Röteln    |
| Reiseimpfung  | FSME („Zecken“), Hepatitis A, Meningokokken (siehe Rückseite)             |